

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

BLOCADREN® DEPOT 5 mg/ml depotøyedråper timolol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
- Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme, eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Blocadren Depot er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Blocadren Depot
3. Hvordan du bruker Blocadren Depot
4. Mulige bivirkninger
5. Hvordan du oppbevarer Blocadren Depot
6. Ytterligere informasjon

1. HVA BLOCADREN DEPOT ER, OG HVA DET BRUKES MOT

Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.

Virkestoffet er timolol.

Blocadren Depot depotøyedråper tilhører en legemiddelgruppe som kalles betablokkere, og som senker trykket i øyet.

Blocadren Depot brukes for å senke forhøyet trykk i øyet, f.eks. ved grønn stær (glaukom) der kammervinkelen er åpen.

2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER BLOCADREN DEPOT

Bruk ikke Blocadren Depot

- dersom du har eller har hatt astma eller andre alvorlige lungesykdommer
- dersom du har eller har hatt visse hjertesykdommer som ukontrollert hjertesvikt eller alvorlige hjerterytmeforstyrrelser
- hvis du er allergisk mot noen av innholdsstoffene.

Vis forsiktighet ved bruk av Blocadren Depot

Rådfør deg med lege dersom du lider av eller tidligere har hatt noen hjerte- eller lungesykdom. Personer som har sukkersyke kan få vanskeligheter med å gjenkjenne symptomer på lave blodsukkerverdier. Hos eldre og personer med hjerte- og karsykdommer bør behandlingen med øyedråper avbrytes en dag før øyeoperasjonen. Hos allergikere kan bruk av preparatet øke følsomheten for allergifremkallende stoffer. Hvis du har mistanke om en allergisk reaksjon (f.eks. hudutslett, røde øyne eller kløe i øyet), må du slutte å bruke preparatet og kontakte lege så fort som mulig. Kontakt lege før du bruker Blocadren Depot dersom du benytter kontaktlinser. Blocadren Depot bør ikke gis til barn (erfaring mangler).

Bruk av andre legemidler sammen med Blocadren Depot

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes hvis legemidlet tas sammen med enkelte andre legemidler. Personer som på forhånd behandles med betablokker for høyt blodtrykk, kan få økt betablokkereffekt. Hvis depotøyedråpene tas samtidig med adrenalin øyedråper, kan pupillestørrelsen øke.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apoteket før du tar noen form for medisin.

Graviditet

Det er mulighet for at fosteret påvirkes.

Amming

Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bruk derfor ikke Blocadren Depot depotøyedråper under amming annet enn når legen har bestemt det.

Kjøring og bruk av maskiner

Siden Blocadren Depot depotøyedråper kan gi forbigående tåkesyn i ½ - 5 minutter etter drypping i øyet, må du forsikre deg om at du ser klart før du f.eks. kjører bil eller utfører arbeid som krever godt syn.


Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakkingsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.

3. HVORDAN DU BRUKER BLOCADREN DEPOT


Bruk alltid Blocadren Depot slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den vanlige dosen er 1 dråpe i det angrepne øyet (øynene) en gang daglig. Hvis Blocadren Depot brukes sammen med andre øyedråper, bør medisinene gis med minst 10 minutters mellomrom (Blocadren Depot dryppes sist). Doseringen må ikke endres uten å rådføre lege. Dersom du må avbryte behandlingen, må du kontakte lege umiddelbart. Dersom du glemmer å ta en dose, ta den så fort som mulig. Hvis det derimot er nesten tid for neste dosering, hopp over den glemte dosen og fortsett som vanlig.

Bruksanvisning

1. Vend flasken og ryst en gang før drypping.
2. Før du bruker øyedråpene første gang, sjekk at forseglingsremsen på forsiden av flasken er ubrutt. Et mellomrom mellom flasken og korken er normalt for en uåpnet flaske.




3. Åpne flasken ved å dra av forseglingsremsen og skru av korken ved å vri i pilenes retning.



- 4 Bøy hodet bakover og trekk nedre øyelokk ned slik at det dannes en "lomme" mellom øyelokket og øyet. Snu flasken opp ned og trykk lett på det avmerkede stedet på flasken slik at en dråpe drypper ned i øyet.

Unngå at flasketuppen berører øyet, huden eller andre overflater.



5. Gjenta dryppingen i det andre øyet dersom forskrevet av legen.
6. Skru på korken etter bruk. Ikke skru korken for hardt igjen.
7. Flasketuppen er designet for å gi en tilmålt dråpe. Hullet i tuppen må derfor IKKE forstørres.
8. Det vil være noe øyedråper igjen i flasken etter at alle dosene er brukt. Det er med hensikt tilsatt en ekstra mengde øyedråper i flasken; du vil få full mengde som legen har forskrevet. Ikke forsøk å fjerne den ekstra væsken fra flasken.

Dersom du tar for mye Blocadren Depot

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.

Dersom du har dryppet for mange dråper i øyet, kan du bli ør, få pustebesvær eller langsom puls.

4. MULIGE BIVIRKNINGER

Som alle legemidler kan Blocadren Depot forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Preparatet tåles vanligvis godt.

Vanlige: Tåkesyn som kan vare i ½-5 minutter etter at dråpene er dryppet inn, kløe, brennende, stikkende følelse i øyet, økt sekretdannelse i øyet, rødsprengte øyne, følelse av fremmedlegeme i øyet, hodepine, svimmelhet.

Mindre vanlige: Sløret syn, betennelse i øyet, forandringer i øyet (i noen tilfeller på grunn av avsluttet behandling med legemidler som innsnevrer pupillen), tretthet, kvalme, lav puls, uregelmessig puls, pustevansker, depresjon.

Sjeldne: Kjørtelbetennelse i øyelokkene, nedsunkne øyelokk, dobbeltsyn, nedsatt følsomhet i øyets hornhinne, tørre øyne, tørrhet i munnen, diaré, halsbrann, håravfall, psoriasislignende utslett eller forverring av psoriasis, avløsning av koroidalhinnen i øyet etter grå stær-operasjon, hjertebank, hjertesvikt, brystmerter, lavt blodtrykk, uregelmessig hjerterytme, hjertestans, pustestans, kramper i bronkiene, hoste, overfølsomhetsreaksjon med utslett og kløe, pustebesvær, ødem, allergi og allergisk utslett, kalde hender og føtter, søvnløshet, mareritt, hukommelsestap, prikkende følelse i huden, forverring av alvorlig muskelsvekkelse, øresus, kraftløshet, nedsatt kjønnsdrift, Peyronies sykdom.

5. HVORDAN DU OPPBEVARER BLOCADREN DEPOT

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevar flasken i kartongen for å beskytte mot lys.

Bruk ikke øyedråpene etter utløpsdatoen som er angitt på flasken etter "Utløpsdato" (Måned-År). Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.

Åpnet flaske brukes innen 1 måned. Begynn da med en ny flaske selv om det er mer igjen i den gamle.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger, skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.

6. YTTERLIGERE INFORMASJON

Sammensetningen av Blocadren Depot

Virkestoffet er timolol. 1 ml inneholder 5,0 mg timolol (som maleat).

Andre innholdsstoffer er: Heteropolysakkarid fremstilt av gellan gum, mannitol, trometamol, sterilt vann.

Konserveringsmiddel: Benzododecinbromid 0,12 mg/ml.

Innholdet i pakningen

Tre flasker à 25 ml.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, Nederland.

Tilvirker

Laboratories Merck Sharp & Dohme – Chibret, Riom, Frankrike.

Representant i Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent juni 2011.